

Механизм действия

Действующим веществом является диазоксид. Блокирует инкрецию избыточного количества инсулина. Реактивно повышает содержание глюкозы в крови. Обладает вазодилататорными свойствами. Задерживает натрий и воду в организме.

Фармакокинетика

Обладает хорошей абсорбцией. Связывается с белками крови на 90%. Максимальная концентрация в плазме определяется спустя 2-3 часа после приема. Период полувыведения составляет 28 часов.

Форма выпуска

Выпускается в капсулах по 100 мг №100.

Применение и дозировка

Применяется внутрь. Суточная доза диазоксида рассчитывается исходя из массы тела. Варьируется в пределах 100-600 мг, разделенных на несколько приемов. Параллельно показано назначение диуретических препаратов.

Показания:

- гиперинсулинемия при гормонпродуцирующих опухолях;
- гипогликемия с чувствительностью к лейцину;
- идиопатическая гипогликемия.

Противопоказания

- индивидуальная непереносимость компонентов препарата;
- патология сердечно-сосудистой системы, особенно инфаркт миокарда в анамнезе;
- лактация.

Побочные реакции

- гипергликемия;
- гипотензия;
- гиперемия кожных покровов.

Аналоги

[Прогликем \(Диазоксид\) капсулы 25 мг №100](#)